

Información importante sobre Plaquinol® y COVID-19

Lima, 17 abril – Hubo un aumento en la cobertura de los medios de comunicación alrededor del uso no aprobado en el Registro Sanitario de la hidroxiclороquina en el tratamiento de COVID-19, sobre la base de los resultados preliminares de estudios independientes de diferentes países. La situación está planteando diversas preguntas de nuestras diferentes partes interesadas.

La seguridad del paciente es la prioridad

Hasta la fecha no hay suficientes pruebas clínicas para sacar conclusiones sobre la eficacia o la seguridad clínica de la hidroxiclороquina (o la cloroquina) en el tratamiento de la COVID-19. Los resultados preliminares de diferentes estudios independientes requieren un análisis más profundo y estudios clínicos más sólidos y amplios para evaluar el perfil riesgo/beneficio de Plaquinol® en el paciente con COVID-19.

En la actualidad, en Perú, Plaquinol® (hidroxiclороquina) está aprobado en DIGEMID en las siguientes indicaciones: antipalúdico; alternativo en el manejo de la artritis reumatoidea aguda y crónica y de la artritis juvenil; en el tratamiento de lupus eritematoso sistémico y discoide.

Todo uso de este medicamento en el tratamiento de COVID-19 se considera un uso no aprobado en el Registro Sanitario (es decir, en ausencia de una autorización de comercialización para la indicación de COVID-19 aunque se hayan emitido directrices/recomendaciones nacionales).

Asegurar la continuidad del suministro

Una de nuestras principales prioridades es asegurar la continuidad del suministro para el uso de Plaquinol® en las indicaciones actuales.

Sanofi está trabajando con las autoridades de salud locales y los expertos científicos de los diferentes países afectados por el brote para investigar el perfil de riesgo/beneficio de Plaquinol® (hidroxiclороquina) del paciente en el tratamiento de COVID-19 y, si lo solicitan los gobiernos locales y/o las autoridades de salud, para suministrar el producto en la medida de lo posible.

Para información, preguntas médicas o preguntas de los farmacéuticos: Por favor, póngase en contacto con el área Médica de Sanofi Perú al correo electrónico: InformacionMedica@sanofi.com

IMPORTANTE RECORDATORIO DE SEGURIDAD SOBRE EL PLAQUINOL®

Los principales efectos secundarios de la hidroxiclороquina se describen en la información del producto. Con la dosis diaria recomendada para las indicaciones aprobadas, que oscila entre 200 y 400 mg (sin exceder los 600 mg al inicio del tratamiento) en adultos para el tratamiento crónico de indicaciones autoinmunitológicas, o en función del peso corporal (y sin exceder los 1550 mg de base en adultos) en el tratamiento agudo contra el paludismo, los efectos secundarios más graves de la hidroxiclороquina son trastornos oculares tras un uso prolongado, incluida la retinopatía, con cambios en la pigmentación y defectos del campo visual, e hipoglucemia grave, incluida la pérdida de conciencia (en pacientes tratados con y sin medicamentos hipoglicemiantes). Los efectos cardiotóxicos son complicaciones raras, pero graves de la hidroxiclороquina, que incluyen trastornos agudos de la conducción cardíaca (prolongación del intervalo QT, arritmia ventricular). También se han descrito trastornos neurológicos, hepáticos y trastornos cutáneos graves y reacciones alérgicas.

La hidroxiclороquina debe utilizarse con precaución en los pacientes que reciben medicamentos que se conoce prolongan el intervalo QT, como algunos antiinfecciosos, por ejemplo, los macrólidos, incluida la azitromicina, debido a un mayor riesgo de arritmia ventricular.

El riesgo y la gravedad de los efectos secundarios pueden aumentar con una posología (dosis) más elevada de hidroxiclороquina.

Los profesionales de la salud deben consultar el Resumen de las Características del Producto actual para obtener la información de seguridad más actualizada. Los pacientes que toman medicamentos que contienen hidroxiclороquina, al igual que otros medicamentos, deben seguir las instrucciones detalladas en el Folleto Informativo para el Paciente.

Los pacientes no deben tomar Plaquinol® sin prescripción o recomendación médica. Siempre deben consultar con sus profesionales de la salud.

Sanofi solicita a las autoridades de salud locales que presenten una postura clara con respecto a falta, en estos momentos, de datos clínicos sólidos para el uso de Plaquinol®, en el tratamiento de COVID-19, haciendo hincapié en que dicho uso será uno no declarado en el etiquetado, y que comuniquen las reacciones adversas graves conocidas asociadas con Plaquinol®, a saber, las contraindicaciones en pacientes con hipersensibilidad conocida a los compuestos de 4-aminoquinolina; con maculopatía ocular preexistente; menores de 6 años (los comprimidos de 200mg no están adaptados para un peso <35 kg) y el riesgo de toxicidad retiniana, hipoglucemia y toxicidad cardíaca, así como el riesgo conocido de interacciones.

Sanofi también solicita que todo uso no declarado en el etiquetado se comunique al equipo de farmacovigilancia de la filial de Sanofi al correo electrónico Farmacovigilancia.Peru@sanofi.com o al sistema nacional de notificación espontánea, ya sea que los pacientes presenten o no eventos adversos.